

דף מידע להורים לפני מתן חיסון נגד נגיף הפפילומה (HPV)

להורי התלמיד/ה שלום רב,

הננו מבקשים להודיעכם כי בשנת לימודים זו יקבל ילדכם חיסון נגיף הפפילומה (HPV). נגיף זה גורם גם ליבלות ולסוגים שונים של סרטן, כגון סרטן צוואר הרחם, סרטן הלוע וסרטן פי הטבעת. ההדבקה היא לרוב ללא סימנים חיצוניים ואדם שנדבק לא מודע לכך שיכול להעביר את הנגיף לאדם אחר. ניתן למנוע את ההדבקה בנגיף הפפילומה על ידי חיסון. החיסון ניתן בזריקה לשריר הזרוע, בשתי מנות, ברווח זמן של 6 חודשים לפחות בין המנות. יש חשיבות רבה בהשלמת שני החיסונים במועדים שנקבעו על מנת להבטיח הגנה מלאה מהנגיף.

במקרים הבאים יש להודיע לאחות בית ספר:

- אם ביום מתן החיסון ילדכם סובל ממחלת חום. במקרה זה עשויה האחות להחליט לדחות את מתן החיסון עד להחלמה.
- אם לילדכם הייתה תגובה קשה לאחר מנה קודמת של אותו חיסון.
- האם לילדכם הייתה תגובה אלרגית מסוג אנפילקטי כגון: לתרופות, מזון, חיסון או ללטקס. למידע זה חשיבות גבוהה לצורך קבלת החלטה על ביצוע החיסון.

לחלק מהתלמידים יתכנו תופעות (תגובות) לאחר קבלת החיסון. אלו לרוב תופעות קלות וחולפות. **תופעות המקומיות** הן אודם, כאבים מקומיים ונפיחות באזור ההזרקה. **תופעות הכלליות** הן עלית חום מיום החיסון ועד היום ה- 15 לאחר החיסון, כאבי ראש, סחרחורות, הרגשה כללית רעה, כאבי שרירים כאבי פרקים ויתכנו כאבי בטן, בחילות שלשולים והקאות. תופעות אלרגיות, לרבות תגובה אלרגית מיידית מסוג אנפילקטי, הן נדירות ביותר.

למידע נוסף:

- על חשיבות ובטיחות החיסונים ניתן למצוא באתר "[הורות והורים](#)" של משרד הבריאות.
- על תופעות לוואי לאחר חיסון ניתן למצוא בעלון היצרן

דף מידע להורים לפני מתן חיסון נגד נגיף הפפילומה
(HPV)